

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

DIETA PRZED KOLONOSKOPIĄ

7 DNI PRZED BADANIEM:

- NIE PRZYJMUY PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŻELAZO;
- NIE SPOŻYWAJ POKARMÓW ZAWIERAJĄCYCH DROBNE ZIARNA (NP. MAK, SEZAM, SŁONECZNIK, SIEMIE LNIANE) OWOCÓW I WARZYW PESTKOWYCH (NP.: WINOGRON, POMIDORÓW, KIWY, TRUSKAWEK, MALIN, OGÓRKÓW) KAPUSTY, KUKURYDZY, GROCHU I FASOLI;
- POZA TYM DIETA LEKKOSTRAWNA.

2 DNI PRZED TERMINEM BADANIA, WOLNO SPOŻYWAĆ TYLKO:

- DIETA PÓŁPŁYNNA: KISIEL, KLEIKI, NAPOJE NIEGAZOWANE, SOKI KLAROWNE, HERBATA, ROSÓŁ PRZECEDZONY.

1 DZIEŃ PRZED TERMINEM BADANIA:

- RANO KISIEL, HERBATA, WODA NIEGAZOWANA, MOŻNA SSAĆ LANDRYNKI, MIÓD,;
- OKOŁO 14 GODZINY JEMY OSTATNI POSIŁEK W FORMIE ROSOŁU PRZECEDZONEGO. MOŻNA PIĆ WODĘ NIEGAZOWANĄ, SŁABĄ HERBATĘ ZIELONĄ Z NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ MIODU, JASNE KLAROWNE SOKI NP.: JABŁKOWY LUB WINOGRONOWY ROZCIEŃCZONY.

ZAŻYWANIE LEKÓW PRZED ZABIEGIEM

W DNIU BADANIA

- NALEŻY ZAŻYĆ PORANNE DAWKI LEKÓW NA: TARCZYCĘ, NADCIŚNIENIE, PRZECIWPADACZKOWE, NA SERCOWE ORAZ LEKI WZIEWNE;
- PACJENCI Z CUKRZYCĄ NIE PRZYMUJĄ LEKÓW OBNIŻAJĄCYCH CUKIER (INSULINA, TABLETKI);
- 4 GODZ. PRZED BADANIEM NIE WOLNO PIĆ;
- NA BADANIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ, KTÓRA CAŁY CZAS POZOSTAJE W PRACOWNI, JEJ BRAK UNIEMOŻLIWI WYKONANIE BADANIA W ZNIECZULENIU;
- OSOBY PRZYJMUJĄCE LEKI OBNIŻAJĄCE KRZEPILNOŚĆ KRWI TYPU: ACENOCUMAROL, SINTROM, TILCID, PLAVIX, ACESAN, XALERTO, PRADAXA I INNE. KONIECZNIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z LEKARZEM O DSTWIENIE W/W LEKÓW.

ZALECA SIĘ ZABRANIE ZE SOBĄ:

- BLUZKI Z LUŻNYM LUB KRÓTKIM RĘKAWEM;
- WYPISÓW ZE SZPITALA;
- WYNIKÓW Z POPRZEDNICH BADAŃ ENDOSKOPOWYCH;
- WYPEŁNIONĄ ORAZ PODPISANĄ ZGODĘ NA BADANIE I ZNIECZULENIE.

NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE BEZ JAKIEJKOLWIEK BIŻUTERII (NP. OBRĄCZKI, BRANSOLETY, ZERGARKA ITP.)

UWAGA : PO ZNIECZULENIU ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW PRZEZ 24 GODZINY

WAŻNE PRZECZYTAJ!!!

1. WARUNKIEM DOBREGO PRZYGOTOWANIA DO BADANIA JEST ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ DIETY, PRZYJMOWANIA ROZTWORU MOVIPREP LUB INNEGO I PICIE DODATKOWYCH PŁYNÓW NP. WODY NIEGAZOWANEJ.
2. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH DIETY ORAZ PICIA DODATKOWYCH PŁYNÓW MOŻE SKUTKOWAĆ KONIECZNOŚCIĄ POWTÓRZENIA BADANIA KOLONOSKOPOWEGO.
3. PO ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ROZTWORU MOVIPREP PRZECHYWAJ W POBLIZU TOALETY.
4. NIE MOŻNA PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH POKARMÓW STAŁYCH OD CHWILI PRZYJMOWANIA LEKU MOVIPREP DO CHWILI ZAKOŃCZENIA BADANIA, MOŻESZ PIĆ TYLKO WSKAZANE PŁYNY.
5. PO WYPICIU ROZTWORU MOVIPREP ODCZEKAJ 15 – 20 MINUT I ROZPOCZNIJ PICIE DODATKOWYCH PŁYNÓW (1L WODY NIEGAZOWANEJ).
6. PO BADANIU NIE PROWADŹ AUTA W DRODZE POWROTNEJ DO DOMU, NIE WRACAJ AUTOBUSEM LUB INNYM PUBLICZNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU.
7. PO BADANIU KOLONOSKOPOWYM PRZEZ KILKA KOLEJNYCH DNI ZASTOSUJ DIETĘ LEKKOSTRAWNĄ.

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

DIETA PRZED KOLONOSKOPIĄ

7 DNI PRZED BADANIEM:

- NIE PRZYJMUIJ PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŻELAZO;
- NIE SPOŻYWAJ POKARMÓW ZAWIERAJĄCYCH DROBNE ZIARNA (NP. MAK, SEZAM, SŁONECZNIK, SIEMIE LNIANE) OWOCÓW I WARZYW PESTKOWYCH (NP.: WINOGRON, POMIDORÓW, KIWI, TRUSKAWEK, MALIN, OGÓRKÓW) KAPUSTY, KUKURYDZY, GROCHU I FASOLI;
- POZA TYM DIETA LEKKOSTRAWNA.

2 DNI PRZED TERMINEM BADANIA, WOLNO SPOŻYWAĆ TYLKO:

- DIETA PÓŁPŁYNNA: KISIEL, KLEIKI, NAPOJE NIEGAZOWANE, SOKI KLAROWNE, HERBATA, ROSÓŁ PRZECEDZONY.

1 DZIEŃ PRZED TERMINEM BADANIA:

- RANO KISIEL, HERBATA, WODA NIEGAZOWANA, MOŻNA SSAĆ LANDRYNKI, MIÓD,;
- OKOŁO 14 GODZINY JEMY OSTATNI POSIŁEK W FORMIE ROSOŁU PRZECEDZONEGO. MOŻNA PIĆ WODĘ NIEGAZOWANĄ, SŁABĄ HERBATĘ ZIELONĄ Z NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ MIODU, JASNE KLAROWNE SOKI NP.: JABŁKOWY LUB WINOGRONOWY ROZCIĘCZONY.

ZAŻYWANIE LEKÓW PRZED ZABIEGIEM

W DNIU BADANIA

- NALEŻY ZAŻYĆ PORANNE DAWKI LEKÓW NA: TARCZYCĘ, NADCIŚNIENIE, PRZECIWPADACZKOWE, NA SERCOWE ORAZ LEKI WZIEWNE;
- PACJENCI Z CUKRZYCĄ NIE PRZYJMUIĄ LEKÓW OBNIŻAJĄCYCH CUKIER (INSULINA, TABLETKI);
- 4 GODZ. PRZED BADANIEM NIE WOLNO PIĆ;
- NA BADANIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ, KTÓRA CAŁY CZAS POZOSTAJE W PRACOWNI, JEJ BRAK UNIEMOŻLIWI WYKONANIE BADANIA W ZNIECZULENIU;
- OSOBY PRZYJMUIĄCE LEKI OBNIŻAJĄCE KRZEPILNOŚĆ KRWI TYPU: ACENOCUMAROL, SINTROM, TILCID, PLAVIX, ACESAN, XALERTO, PRADAXA I INNE. KONIECZNIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z LEKARZEM ODSWIENIE W/W LEKÓW.

ZALECA SIĘ ZABRANIE ZE SOBĄ:

- BLUZKI Z LUŻNYM LUB KRÓTKIM RĘKAWEM;
- WYPISÓW ZE SZPITALA;
- WYNIKÓW Z POPRZEDNICH BADAŃ ENDOSKOPOWYCH;
- WYPEŁNIONĄ ORAZ PODPISANĄ ZGODĘ NA BADANIE I ZNIECZULENIE.

NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE BEZ JAKIEJKOLWIEK BIŻUTERII (NP. OBRĄCZKI, BRANSOLETY, ZERGARKA ITP.)

UWAGA : PO ZNIECZULENIU ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW PRZEZ 24 GODZINY

WAŻNE PRZECZYTAJ!!!

1. WARUNKIEM DOBREGO PRZYGOTOWANIA DO BADANIA JEST ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ DIETY, PRZYJMOWANIA **ROZTWORU MOVIPREP LUB INNEGO** I PICIE DODATKOWYCH PŁYNÓW NP. WODY NIEGAZOWANEJ.
2. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH DIETY ORAZ PICIA DODATKOWYCH PŁYNÓW MOŻE SKUTKOWAĆ KONIECZNOŚCIĄ POWTÓRZENIA BADANIA KOLONOSKOPOWEGO.
3. PO ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ROZTWORU MOVIPREP PRZEBYWAJ W POBLIZU TOALETY.
4. NIE MOŻNA PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH POKARMÓW STAŁYCH OD CHWILI PRZYJMOWANIA LEKU MOVIPREP DO CHWILI ZAKOŃCZENIA BADANIA, MOŻESZ PIĆ TYLKO WSKAZANE PŁYNY.
5. PO WYPICIU ROZTWORU MOVIPREP ODCZEKAJ 15 – 20 MINUT I ROZPOCZNIJ PICIE DODATKOWYCH PŁYNÓW (1L WODY NIEGAZOWANEJ).
6. PO BADANIU NIE PROWADŹ AUTA W DRODZE POWROTNEJ DO DOMU, NIE WRACAJ AUTOBUSEM LUB INNYM PUBLICZNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU.
7. PO BADANIU KOLONOSKOPOWYM PRZEZ KILKA KOLEJNYCH DNI ZASTOSUJ DIETĘ LEKKOSTRAWNĄ.